



赤ちゃんの健康を願って

すくすくのびのび育ちますように

1 乳幼児健診・健康相談

年齢別に行われる健康診査や相談・講習会

	事業名	実施場所	対 象	お知らせの方法	主な内容
0 歳	1か月児 健康診査※1	主に出生病院	1か月児	出生病院にご確認ください	
	2か月児相談	保健相談所	2～3か月児 (4か月児健診前まで)	区報・ホームページに日時を掲載	育児・食事の話、グループ相談・交流
	4か月児 健康診査	保健相談所	4か月児	生後2か月頃に個別通知	身体計測、診察、育児・食事の相談
	6か月児 健康診査	都内契約 医療機関	6～7か月児※2 (6か月になる日から8か月になる前日まで)	4か月児健診時に 受診票を配付	身体計測、診察、保健指導
	9か月児 健康診査		9～10か月児※2 (9か月になる日から11か月になる前日まで)		身体計測、診察、保健指導
	赤ちゃんからの 飲む食べる相談	保健相談所	0歳児～1歳過ぎ頃の 親子	区報・ホームページに日時を掲載 予約制・先着順	赤ちゃんや幼児のいる家庭の食事についての相談会 (小グループ)
1 歳	1歳児 子育て相談	保健相談所	10か月～1歳4か月児		身体計測、歯みがき・食事・育児の相談、1歳からの食事講習会
	1歳6か月児 健康診査	区内契約 医療機関 保健相談所	1歳6～11か月児※2 (1歳6か月になる日から2歳になる前日まで)	1歳6か月になる 前月に個別通知	身体計測、診察、保健指導 歯科健診、育児・食事・心理発達・歯みがき相談

	事業名	実施場所	対 象	お知らせの方法	主な内容
2歳	2歳児 歯科健康診査・ 子育て相談	保健相談所	2歳0か月児	2歳になる前月に 個別通知	歯科健診、育児・食 事・心理発達・歯みが き相談
	2歳6か月児 歯科健康診査	保健相談所	2歳6～10か月児	区報・ホームペー ジに日時を掲載 予約制・先着順	歯科健診、歯みがき 相談
3歳	3歳児健康診査	保健相談所	3歳児 (3歳1か月から4歳にな る前日まで)	3歳になる月に個 別通知	身体計測、診察、歯科 健診、尿検査、視力検 査、視力・聴力アン ケート検査、育児・食 事・心理発達・歯みが き相談
0 ～ 3歳	育児栄養歯科 相談	保健相談所	0歳～3歳児 (0歳児～4歳になる前日 まで)	区報・ホームペー ジに日時を掲載 予約制・先着順	身体計測、育児・食 事・歯みがき相談
年 長	就学時健康診断	学区域の 小学校	次年度小学校へ入学予 定の幼児	10月頃に通知	内科、眼科、耳鼻科、 歯科、視力、聴力、知 能検査

※1 費用は自己負担となります。

※2 契約医療機関での健康診査について、対象月齢・年齢の期間内に受診してください。



赤ちゃんの健康を願って



2 予防接種

問 練馬区保健所保健予防課予防接種係
TEL 5984-2484

練馬区では、該当するお子さんに予診票を送付します。練馬区に転入してきたなどの事情により予診票が届かない場合は、お問い合わせください。7歳以降に接種するワクチンについては、母子健康手帳等をご確認ください。

里帰り先での定期予防接種を予定されている方は、 **P46**「里帰り出産等による定期予防接種費用助成」をご覧ください。

定期予防接種

(令和7年4月1日現在)

予防接種の種類		予診票 送付時期	対象年齢	標準的な接種時期	実施場所
BCG(結核)		生後2か月 になる月	1歳に至るまで	生後5か月から8か月に至るまで に1回接種	練馬区、練馬区以外の22区、西東京市(BCG(結核)を除く)および武蔵野市の予防接種協力医療機関
B型肝炎	1回目 2回目	生後2か月 になる月	1歳に至るまで	生後2か月から27日以上の間隔 をおいて2回接種	
	3回目			1回目の接種から139日以上の間隔 をおいて1回接種	
ロタ ウイルス	1価 または 5価	生後2か月 になる月	出生6週0日後 から出生24週0 日後まで	生後2か月から出生24週0日後まで (※1回目の接種は出生14週6日後ま で)に、27日以上の間隔をおいて2回	
			出生6週0日後 から出生32週0 日後まで	生後2か月から出生32週0日後まで (※1回目の接種は出生14週6日後ま で)に、27日以上の間隔をおいて3回	
小児用 肺炎球菌	初回	生後2か月 になる月	生後2か月から 60か月(5歳)に 至るまで	生後2か月から12か月に至るまでに、 27日以上の間隔をおいて3回接種	
	追加	生後11か月 になる月		初回の3回目の接種を終了してから60 日以上の間隔をおいて生後12か月か ら15か月に至るまでの間に1回接種	
DPT-IPV- Hib (5種混合) (ジフテリア・百日せ き・破傷 風・不活化 ポリオ・ヒ ブ)※1	第1期 初回	生後2か月 になる月	生後2か月から 90か月 (7歳6か月)に 至るまで	生後2か月から7か月に至るまで に開始し、4週間(医師が必要と認 めた場合には3週間)から8週間ま での間隔をおいて3回接種	
	第1期 追加	生後11か月 になる月		第1期初回の3回目の接種を終了 してから6か月～18か月の間隔 をおいて1回接種	
MR (麻しん風 しん混合)	第1期	生後11か月 になる月	生後12か月か ら24か月(2歳) に至るまで	生後12か月以降なるべく早い時 期	
	第2期	小学校入学 就学前の4月	小学校入学 就学前の1年間 (4月～3月)		

予防接種の種類		予診票 送付時期	対象年齢	標準的な接種時期	実施場所
水痘(みずぼうそう)		生後11か月 になる月	生後12か月から 36か月(3歳) に至るまで	1回目:生後12か月から15か月に 至るまで 2回目:1回目の接種後6か月～12 か月の間隔をおく	練馬区、練 馬区以外の 22区、西東 京市および 武蔵野市の 予防接種協 力医療機関
日本脳炎	第1期 初回	3歳 になる月※2	生後6か月から 90か月 (7歳6か月)に 至るまで	3歳から4歳に至るまでの間に、6 日～28日の間隔をおいて2回接 種	
	第1期 追加			4歳から5歳に至るまでの間に、第 1期初回終了後、おおむね1年を経 過した時期に1回接種	

※1 DPT-IPV(4種混合)ワクチンで接種を開始したと推定される生年月日の方には、DPT-IPV(4種混合)の予診票をお送りしています。詳しくは、区ホームページをご確認いただくか、保健予防課予防接種係(TEL 5984-2484)へお問い合わせください。

※2 3歳未満で接種を受ける場合、ワクチン量が通常の半分(0.25mℓ)での接種になります。予診票送付時期より前に接種を希望する場合は、保健予防課予防接種係(TEL 5984-2484)まで、お問い合わせください。

任意予防接種

予防接種の種類	予診票送付時期	対象年齢	助成回数	実施場所
おたふくかぜ※1	生後11か月 になる月	生後12か月から 36か月に至るまで	1回	練馬区の予防接 種協力医療機関
MR(麻しん風しん混合) 未接種者対策	申込制	2歳以上19歳未満 (定期予防接種対 象者は除く)	最大2回(定期予防 接種の未接種回数 を限度とする)	
小児インフルエンザ ※2、※3	9月下旬頃	生後6か月～小学6 年生	2回	

※1 おたふくかぜは3,000円助成です(生活保護受給中の方は全額助成)。

※2 小児インフルエンザは、1回ごとに2,000円助成です(生活保護受給中の方は全額助成)。

※3 小児インフルエンザの実施期間は例年10月1日～1月31日を予定しております。



予防接種の種類		回数	1か月	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9か月	10か月	11か月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	費用
定期予防接種	BCG(結核)㊥	1回					①														
	B型肝炎㊥	3回		① ②				③													
	ロタウイルス㊥	1価		① ②																	
		5価			① ② ③																
	小児用肺炎球菌※1㊥	4回			初回①②③									追加							
	DPT-IPV-Hib第1期㊥(5種混合)	4回				初回①②③								追加							
	MR(麻しん風しん混合)㊥第1期・第2期※2	2回												①					②		
	水痘㊥(みずぼうそう)	2回												①	②						
任意予防接種	日本脳炎第1期※3㊥	3回													初回①②				追加		
	おたふくかぜ㊥	1回																			3,000円 助成※4

㊥ : 不活化ワクチン ㊥ : 生ワクチン 接種対象期間 標準的な接種期間

※定期予防接種は、予防接種法に基づいたものです。

※1 小児用肺炎球菌は、接種開始時期や、初回の接種時期によって、接種回数が変わります。

※2 MR(麻しん風しん混合)第2期の接種時期は、5歳以上7歳未満で、小学校就学前の1年間(4月1日～3月31日)になります。

※3 日本脳炎は、標準的には3歳から接種します。3歳未満での接種を希望する場合は、保健予防課予防接種係(TEL 5984-2484)までお問い合わせください。

※4 生活保護受給中の方は、全額助成されます。



3 子どもの健康

かかりやすい病気

お子さんがかかりやすい病気について、予備知識をもっておきましょう。

病名	かかりやすい年齢	潜伏期間	症状
突発性発疹	6か月～2歳	9～10日	38度以上の高熱が3～4日続いた後、熱が下がるとともに赤い発しんが出ます。発しんはあとを残さず1～2日で消えます。
麻疹(はしか)		8～12日	38度以上の高熱、せき、鼻水、目やになどが出ます。一時下がった熱がまた高くなり、全身に赤い発しんが出ます。熱は下がり、発しんは色素沈着を残して消えます。
水痘(水ぼうそう)	9歳以下	14～16日	発しんが全身、頭や口の中にも出ます。赤い発しんが水ぶくれ、かさぶたと変化します。発しんのかゆみが強いです。
伝染性紅斑(りんご病)	幼児・学童期	4～14日	軽い風邪症状の後、頬が赤くなったり手足に網目状の赤い発しんが出ます。発しんが治っても、直射日光にあたったり、入浴をすると発しんが再発することがあります。
溶連菌感染症	5歳～15歳	2～5日	突然の発熱、咽頭痛があり、嘔吐することもあります。かゆみのある発しんが出ることもあります。抗菌剤を内服して治療します。
ロタウイルス感染症	3歳未満	1～3日	嘔吐、下痢、発熱がおきます。下痢は白い便です。冬に流行します。
手足口病	5歳以下	3～6日	水ぼう状の発しんが手、足、口の中にできます。夏に流行します。
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)	2歳～7歳	6～18日	発熱し、片方あるいは両方の耳下腺がはれます。はれは3～7日で消えます。
風しん(三日はしか)		16～18日	発熱し、発しんが出ます。発熱の程度は軽いことが多いです。発しんは淡紅色で、顔から頭、体にひろがり、約3日で消えます。
RSウイルス感染症	0～3歳	4～6日	発熱、せき、鼻水などの風邪のような症状から重い肺炎まで様々です。特に1歳以下では、細気管支炎、肺炎などの重篤な症状を引き起こすことがあります。

赤ちゃんの健康を願って

(「東京都感染症マニュアル2018」「こども家庭庁保育所における感染症対策ガイドライン(令和5年10月一部改訂版)」より)

市外局番は03です



歯と口の健康

赤ちゃんの歯

乳歯は、妊娠7週頃からつくられはじめます。丈夫な歯にするためには、カルシウムだけではなく、たんぱく質、リン、ビタミンA・C・Dなどの栄養素を含む食品をバランスよくとることが大切です。

子どもの歯と口のケア

月 齢	むし歯になりやすいところ	歯みがきのポイント・注意点
6 〜 9 か 月 頃		機嫌がよいときなどにスキンシップをしながら、歯の手入れを始める準備をします。大人のひざにあお向けに寝かせて口の中を観察し、やさしくマッサージするように歯や歯肉を指でさわってみましょう。慣れてきたら歯をガーゼで拭いてあげます。
1 歳 頃	 ●前歯の歯と歯の間、歯と歯肉の境目	上下の前歯が生えてきたら、仕上げみがきをスタートします。甘い飲み物は「むし歯」になりやすいため、習慣的に飲むことはやめましょう。特に哺乳瓶に入れて飲むと、甘い飲み物が長い時間歯にふれるため、むし歯になりやすい環境をつくりまします。寝かしつけのための母乳やミルクを少しずつ減らし、卒乳の準備をしていきます。
1 歳 6 か 月 〜 2 歳 頃	 ●前歯の歯と歯の間、歯と歯肉の境目 ●奥歯の溝	この頃は、まだ歯みがきを嫌がるお子さんも多いですが、歌をうたったり励ましたりしながら、楽しく歯みがきができる工夫をしましょう。歯と歯の間には、必要に応じてデンタルフロスなどを使います。寝かしつけのための授乳は、この頃までの卒乳が望ましいでしょう。
3 歳 頃	 ●奥歯の溝 ●奥歯の歯と歯の間	歯の大切さやむし歯がなぜできるのかなど、お話をしてあげましょう。食べたらかみがく習慣をつけ、自分でみがく練習をしていきますが、保護者による仕上げみがきは必要です。おやつは時間と量を決め、ダラダラと食べることはやめましょう。また、この時期は乳歯が生えそろう、かむ力も育ってきます。普段の食事の中で、かむ回数を増やせる海藻や野菜類を使うなどしてたくさんかむようにします。かむ回数を増やすことで、あご周りの血流がよくなり筋肉が刺激され、あごが成長してきます。
6 歳 頃	 第一大臼歯	第一大臼歯(永久歯)が生え始めます。乳歯の奥に生えてくるため気づきにくく、また歯ブラシが届きにくいので、とてもむし歯になりやすい歯です。生えてきているか定期的にチェックし、ていねいにみがくように心がけましょう。

歯みがき事故に注意

お子さんが歯みがき中にケガをする事故が発生しています。安全な歯みがき習慣を身に付けるため、必ず保護者がそばにつき添い、目を離さないようにしましょう。